Le Fief de la Garde

En plus des orchidées, beaucoup de plantes remarquables poussent sur les pelouses calcaires et en lisière de bois. Elles constituent un patrimoine naturel unique en Charente Maritime.

3 espèces figurent sur la Liste Rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO 1998) (PR):

La porcelle maculée, *Hypochoeris maculata*
Famille des Astéracées. Plante absente du Nord-Ouest.
Ht : 30-70 cm. Floraison : VI. **(PR).**

La scorzonère hirsute, *Scorzonera hirsuta*
Famille des Astéracées. Plante de la région méditerranéenne, absente dans le Nord et le Nord- Ouest de la France.
Ht : 20 à 40 cm. Floraison : V-VI. **(PR).**

Le petit pigamon, *Thalictrum minus.*
Famille des Renonculacées. En voie de raréfaction. Sur le site, un seul pied a été observé en 2018. Ht : 20-90 cm. Floraison : V-VI. **(PR).**

Autres plantes remarquables

Le seseli libanotis, *Libanotis pyrenaica*
Famille des Apiacées. Eurasiatique. Plante protégée dans plusieurs régions de France (ex : Pays de Loire), absent du Massif armoricain et de la région méditerranéenne.
Ht 30 cm - 1,60 mètre, Floraison : VII-IX.

La cupidone bleue, *Catananche caerulea*
Famille des Astéracées. Plante méditerranéenne.
Sa limite Nord : Sud Deux-Sèvres. Ht 50-80cm. Floraison : VI-VIII.

La cardoncelle molle, *Carduncellus mitissimus*
Famille des Astéracées. Plante subatlantique franco-ibérique. Ici, elle est quasiment à sa limite d'aire Nord-Ouest (une seule station au-delà, en Sud Vendée, près de Maillezais). Ht 10-20cm. Floraison : V-VII.

Le mélampyre à crêtes, *Melampyrum cristatum*

Famille des Scrofulariacées. Eurasiatique des bois et pâturages secs.

Présent dans une grande partie de la France, absent en Méditerranée.
Ht 20-30 cm. Floraison V-VIII.

La spirée filipendule, *Filipendula vulgaris*

Famille des Rosacées. Eurasiatique, prairies sèches.
Ht 25-60 cm. Floraison V-VII.

La globulaire commune, *Globularia bisnagarica*

Plante typique des terrains calcaires squelettiques.
Présente dans toute la France sauf en Bretagne.
Ht 5-30 cm. Floraison IV-VI.

L'Odontites jaune, *Odontites luteus*

Famille des Orobanchacées. Eurasiatique des lieux secs et arides.
Ht 10-50 cm. Floraison VIII-IX.

La carline commune, *Carlina vulgaris*

Famille des Astéracées. Eurasiatique des terrains arides.
Ht 20-50 cm. Floraison VII-IX.

L'inule à feuilles de saule, *Inula salicina*

Famille des Astéracées. Eurasiatique des terrains calcaires.
Absente du Massif Armoricain, rare dans l'Ouest. Elle est ici presque à sa limite Nord-Ouest (quelques localités en Sud-Vendée).
Ht 30-60 cm. Floraison VI-VIII.

Réalisation : Anne Richard, www.afleurdemaree.fr